

ตัวอย่างสารติดการใช้กับดัก **Stiener trap**


และสารเมทริลยูจีนอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาโทออน57% EC ในอัตรา 3:1
เพื่อการสำรวจประชากรแมลงวันผลไม้

／ สารติดฝึกปฏิบัติการทำกับดักด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างง่าย

ใช้กับสารเมทริลยูจีนอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาโทออน57% EC ในอัตรา 3:1
เพื่อใช้ในสวนไม้ผลสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ตัวผู้

／ การใช้เหยื่อพิษ

กับดัก Stienner trap



สารเมทิลยูจีนอลผสม
สารฆ่าแมลงมาลาโทอน 57% EC
สำเร็จรูป




สารเมทิลยูจีนอลผสม
สารฆ่าแมลงมูลาไทออน 57% EC
อัตรา 3:1

แบบเก่า



กับดักที่ทำด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างง่าย
ใช้กับสารเมทิลดิวจินอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 57% EC
ในอัตรา 3:1

เพื่อใช้ในสวนไม้ผลสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ตัวผู้



การใช้เหยื่อพิษ

